

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

OLP 26-10-66 560262

EDITION DE LA STATION D'ORLEANS (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIEVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS
C.C.P.: ORLÉANS 4604-25

ABONNEMENT ANNUEL

~~25 Francs~~

BULLETIN TECHNIQUE N° 73

OCTOBRE 1966

- 34 -

AVIS AUX ABONNES

Nous informons dès maintenant nos abonnés que par décision du Ministère de l'Agriculture le montant d'un abonnement simple a été fixé à 25 Francs.

Afin de faciliter notre tâche nous demandons de ne pas effectuer de versement pour le moment et d'attendre l'avis de réabonnement qui paraîtra dans le prochain Bulletin.

LES TRAITEMENTS D'AUTOMNE DES ARBRES FRUITIERS

Certaines maladies des arbres fruitiers à pépins et à noyaux se combattent à l'automne, à la chute des feuilles. Parmi les plus dangereuses nous pouvons citer le Coryneum du pêcher, le Chancre Bactérien du cerisier, la Maladie Bactérienne du poirier.

Contre les Tavelures certaines techniques ou traitements appliqués pendant le repos de la végétation facilitent la lutte contre ces maladies au printemps suivant. Nous en parlerons dans notre prochain Bulletin.

CORYNEUM DU PECHER OU MALADIE CRIBLEE -

Le champignon responsable de la maladie criblée, CORYNEUM BELJERINCKII (Oud) cause également des dégâts sur abricotiers, cerisiers et amandiers.

Sur les feuilles la maladie se manifeste par l'apparition de petites taches rougeâtres puis brunâtres dont le centre se dessèche et tombe laissant le limbe perforé, d'où le nom de "maladie criblée" que l'on donne parfois au Coryneum.

Les attaques sur rameaux sont de beaucoup les plus dangereuses et se traduisent par la formation sur les jeunes branches de taches brunâtres plus ou moins allongées qui s'aggrandissent et forment des petits chancres d'où s'écoule la gomme. La partie du rameau située au-dessus du chancre se dessèche souvent. Les bourgeons contaminés sont détruits et ne débourrent pas au printemps suivant.

Les traitements effectués à l'automne ont pour but de limiter les contaminations sur jeunes rameaux qui se produisent au cours des pluies automnales. Ce sont les blessures laissées par la chute des feuilles qui sont les portes d'entrée du champignon. Toutefois les attaques sur rameaux à l'automne ne sont vraiment graves que sur les pêchers et les amandiers.

La bouillie bordelaise, les produits à base de cuivre, utilisés à raison de 500 g de cuivre par hectolitre d'eau, sont efficaces contre le Coryneum. Afin d'éviter des brûlures les traitements devront être effectués sur des rameaux aoûtés et si possible par temps sec.

P.1.150

.../...

CHANCRE BACTERIEN DU CERISIER -

Le chancre bactérien du cerisier se rencontre dans de nombreux vergers. Les symptômes de la maladie sont les suivants :

- Yeux qui ne débourrent pas au printemps,
- Bouquets de mai qui se dessèchent avec ou sans formation de gomme,
- Bouquets foliaires qui se flétrissent et se dessèchent en cours de végétation,
- Feuilles présentant au printemps des taches d'abord jaunâtres translucides, puis devenant brunes avec un halo et dont le centre se détache finalement,
- Branches et tronc portant des lésions profondes de l'écorce pouvant entraîner la mort de la partie située au-dessus du chancre. Ces lésions chancreuses sont souvent aplaties, déprimées et laissent exsuder la gomme.

Les bactéries peuvent pénétrer dans la plante par les cicatrices laissées par la chute des feuilles. Il est donc conseillé d'appliquer un traitement quand les deux tiers des feuilles sont tombés, en utilisant une bouillie bordelaise à 1 ou 1,5 % de sulfate de cuivre ou un produit contenant du cuivre.

MALADIE BACTERIENNE DU POIRIER -

Cette maladie provoque l'annulation des yeux à bois et à fruits au printemps, le flétrissement des pousses herbacées et des inflorescences au moment ou après la floraison, la formation de taches noirâtres sur les feuilles et sur les fruits, l'apparition de lésions chancreuses plus ou moins importantes sur les rameaux.

Les bactéries responsables ne peuvent pas pénétrer directement dans les organes susceptibles d'être contaminés. Une porte d'entrée leur est nécessaire. Les cicatrices laissées par la chute des feuilles sont une des portes d'entrée indispensables à la contamination.

Un traitement effectué avec un produit à base de cuivre quand les trois quart des feuilles sont tombés peut donc limiter dans une certaine mesure la manifestation de cette maladie au printemps.

CHANCRE DU POMMIER -

Les manifestations de cette maladie sont bien connues des arboriculteurs. Les contaminations les plus graves ont lieu par les cicatrices laissées par la chute des feuilles.

Dans les vergers fortement contaminés, il est donc nécessaire d'effectuer deux traitements en utilisant un produit à base de cuivre à la dose voulue pour avoir 1 000 g de cuivre par hectolitre d'eau. Le premier traitement sera exécuté lorsqu'un tiers des feuilles sera tombé ; le deuxième lorsque les deux tiers des feuilles seront tombés. Si on n'effectue qu'un traitement il sera préférable de l'appliquer lorsque la moitié des feuilles sera tombée.

Ce traitement devra être complété par la suppression des chancres ou le nettoyage et la désinfection des plaies chancreuses et grosses plaies de taille avec des spécialités désinfectantes et cicatrisantes.

DESSECHEMENT DES RAMEAUX DE FRAMBOISIERS -

Un traitement effectué à la chute des feuilles avec un produit à base de cuivre à la dose voulue pour avoir 200 à 300 g de cuivre par hectolitre d'eau sera efficace contre cette maladie.

Il devra être complété par la suppression des rameaux les plus attaqués.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles,
G. RIBAUT.
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
G. BENAS.